



Diskrete Mathematik

Ralph Bottesch

David Obwaller

Burak Ekici

Vincent van Oostrom

Johannes Koch

Oleksandra Panasiuk

Georg Moser

Zusammenfassung der letzten LVA

Definition (Beweisformen)

Beweisformen sind etwa (i) **deduktive Beweise** (ii) **Beweise von Mengeninklusionen** (iii) **Kontraposition** (iv) **indirekte Beweise** (v) induktive Beweise (vi) **Gegenbeispiele**

Beispiel

Die Kontraposition der Aussage

„es regnet \Rightarrow die Straße ist nass“

„die Straße ist trocken \Rightarrow es regnet nicht“

ist

Beispiel (Kontraposition in der Realität)

We arrive at the following paradox in a globalised world: when nationalists pursue more formal sovereignty they achieve less real sovereignty of the people. They want to take back control and they end up with less control. That's what the UK will end up with. And that's also what the Catalan nationalists will achieve if they pursue their nationalistic dreams.

Yet this paradox also has a corollary: when countries in Europe renounce formal sovereignty this leads to more real sovereignty for the peoples of Europe.¹

¹Paul De Grauwe, <https://blogs.lse.ac.uk/brexit/2017/10/06/the-catalan-crisis-and-brexit-stem-from-the-same-kind-of-nationalism/>

Beispiel (Kontraposition in der Realität)

We arrive at the following paradox in a globalised world: when nationalists pursue more formal sovereignty they achieve less real sovereignty of the people. They want to take back control and they end up with less control. That's what the UK will end up with. And that's also what the Catalan nationalists will achieve if they pursue their nationalistic dreams.

*Yet this paradox also has a **corollary**: when countries in Europe renounce formal sovereignty this leads to more real sovereignty for the peoples of Europe.¹*

¹Paul De Grauwe, <https://blogs.lse.ac.uk/brexit/2017/10/06/the-catalan-crisis-and-brexit-stem-from-the-same-kind-of-nationalism/>

Beispiel (Kontraposition in der Realität)

We arrive at the following paradox in a globalised world: when nationalists pursue more formal sovereignty they achieve less real sovereignty of the people. They want to take back control and they end up with less control. That's what the UK will end up with. And that's also what the Catalan nationalists will achieve if they pursue their nationalistic dreams.

Yet this paradox also has a corollary: when countries in Europe renounce formal sovereignty this leads to more real sovereignty for the peoples of Europe.¹

Beispiel

Für alle natürlichen Zahlen $n \geq 2$ gilt: $n^2 \geq 2n$

¹Paul De Grauwe, <https://blogs.lse.ac.uk/brexit/2017/10/06/the-catalan-crisis-and-brexit-stem-from-the-same-kind-of-nationalism/>

Inhalte der Lehrveranstaltung

Beweismethoden

deduktive Beweise, Beweise von Mengeninklusionen, Kontraposition, Widerspruchsbeweise, vollständige Induktion, wohlfundierte Induktion, strukturelle Induktion, Gegenbeispiele

Relationen, Ordnungen und Funktionen

Äquivalenzrelationen, partielle Ordnungen, Wörter, asymptotisches Wachstum

Graphentheorie

gerichtete Graphen, ungerichtete Graphen

Zähl- und Zahlentheorie

Aufzählen und Nummerieren von Objekten Lösen von Rekursionsformeln, Mastertheorem, Rechnen mit ganzen Zahlen, euklidischer Algorithmus, Primzahlen, Restklassen

Inhalte der Lehrveranstaltung

Beweismethoden

deduktive Beweise, Beweise von Mengeninklusionen, Kontraposition, Widerspruchsbeweise, vollständige Induktion, wohlfundierte Induktion, strukturelle Induktion, Gegenbeispiele

Relationen, Ordnungen und Funktionen

Äquivalenzrelationen, partielle Ordnungen, Wörter, asymptotisches Wachstum

Graphentheorie

gerichtete Graphen, ungerichtete Graphen

Zähl- und Zahlentheorie

Aufzählen und Nummerieren von Objekten Lösen von Rekursionsformeln, Mastertheorem, Rechnen mit ganzen Zahlen, euklidischer Algorithmus, Primzahlen, Restklassen

Relationen und Ordnungen

Definition

$R \subseteq M \times M$ heißt **Relation auf M** ; R heißt

- **reflexiv**, wenn für alle $x \in M$, $(x, x) \in R$
- **irreflexiv**, wenn für kein $x \in M$, $(x, x) \in R$
- **symmetrisch**, wenn für alle $x, y \in M$
 $(x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$
- **antisymmetrisch**, wenn für alle $x, y \in M$
 $(x, y) \in R$ und $(y, x) \in R \Rightarrow x = y$
- **transitiv**, wenn für alle $x, y, z \in M$
 $(x, y) \in R$ und $(y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$

Beispiel

- $R_1 := \{(0, 0), (1, 1), (2, 2)\}$ auf $\{0, 1, 2\}$
- $R_2 := \emptyset$ auf $\{0\}$
- $R_3 := \{(0, 0), (2, 1)\}$ auf $\{0, 1, 2\}$
- $R_4 := \{(0, 0), (1, 2), (2, 1)\}$ auf $\{0, 1, 2\}$
- $R_5 := \emptyset$ auf \emptyset

| | reflexiv | irreflexiv | symmetrisch | antisymmetrisch | transitiv |
|-------|----------|------------|-------------|-----------------|-----------|
| R_1 | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| R_2 | | | | | |
| R_3 | | | | | |
| R_4 | | | | | |
| R_5 | | | | | |

Beispiel

- $R_1 := \{(0, 0), (1, 1), (2, 2)\}$ auf $\{0, 1, 2\}$
- $R_2 := \emptyset$ auf $\{0\}$
- $R_3 := \{(0, 0), (2, 1)\}$ auf $\{0, 1, 2\}$
- $R_4 := \{(0, 0), (1, 2), (2, 1)\}$ auf $\{0, 1, 2\}$
- $R_5 := \emptyset$ auf \emptyset

| | reflexiv | irreflexiv | symmetrisch | antisymmetrisch | transitiv |
|-------|----------|------------|-------------|-----------------|-----------|
| R_1 | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| R_2 | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| R_3 | | | | | |
| R_4 | | | | | |
| R_5 | | | | | |

Beispiel

- $R_1 := \{(0, 0), (1, 1), (2, 2)\}$ auf $\{0, 1, 2\}$
- $R_2 := \emptyset$ auf $\{0\}$
- $R_3 := \{(0, 0), (2, 1)\}$ auf $\{0, 1, 2\}$
- $R_4 := \{(0, 0), (1, 2), (2, 1)\}$ auf $\{0, 1, 2\}$
- $R_5 := \emptyset$ auf \emptyset

| | reflexiv | irreflexiv | symmetrisch | antisymmetrisch | transitiv |
|-------|----------|------------|-------------|-----------------|-----------|
| R_1 | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| R_2 | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| R_3 | × | × | × | ✓ | ✓ |
| R_4 | | | | | |
| R_5 | | | | | |

Beispiel

- $R_1 := \{(0, 0), (1, 1), (2, 2)\}$ auf $\{0, 1, 2\}$
- $R_2 := \emptyset$ auf $\{0\}$
- $R_3 := \{(0, 0), (2, 1)\}$ auf $\{0, 1, 2\}$
- $R_4 := \{(0, 0), (1, 2), (2, 1)\}$ auf $\{0, 1, 2\}$
- $R_5 := \emptyset$ auf \emptyset

| | reflexiv | irreflexiv | symmetrisch | antisymmetrisch | transitiv |
|-------|----------|------------|-------------|-----------------|-----------|
| R_1 | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| R_2 | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| R_3 | × | × | × | ✓ | ✓ |
| R_4 | × | × | ✓ | × | × |
| R_5 | | | | | |

Beispiel

- $R_1 := \{(0, 0), (1, 1), (2, 2)\}$ auf $\{0, 1, 2\}$
- $R_2 := \emptyset$ auf $\{0\}$
- $R_3 := \{(0, 0), (2, 1)\}$ auf $\{0, 1, 2\}$
- $R_4 := \{(0, 0), (1, 2), (2, 1)\}$ auf $\{0, 1, 2\}$
- $R_5 := \emptyset$ auf \emptyset

| | reflexiv | irreflexiv | symmetrisch | antisymmetrisch | transitiv |
|-------|----------|------------|-------------|-----------------|-----------|
| R_1 | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| R_2 | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| R_3 | × | × | × | ✓ | ✓ |
| R_4 | × | × | ✓ | × | × |
| R_5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Äquivalenzrelationen

Definition

Eine **Äquivalenzrelation** \sim ist eine reflexive, symmetrische, transitive Relation

Äquivalenzrelationen

Definition

Eine **Äquivalenzrelation** \sim ist eine reflexive, symmetrische, transitive Relation

Definition

- x und y heißen **äquivalent**, wenn $(x, y) \in \sim$ bzw. $x \sim y$

Äquivalenzrelationen

Definition

Eine **Äquivalenzrelation** \sim ist eine reflexive, symmetrische, transitive Relation

Definition

- x und y heißen **äquivalent**, wenn $(x, y) \in \sim$ bzw. $x \sim y$
- **Äquivalenzklasse** von x $[x] := \{y \in M \mid x \sim y\}$

Äquivalenzrelationen

Definition

Eine **Äquivalenzrelation** \sim ist eine reflexive, symmetrische, transitive Relation

Definition

- x und y heißen **äquivalent**, wenn $(x, y) \in \sim$ bzw. $x \sim y$
- **Äquivalenzklasse** von x $[x] := \{y \in M \mid x \sim y\}$
- Elemente einer Äquivalenzklasse K heißen **Repräsentanten** von K

Äquivalenzrelationen

Definition

Eine **Äquivalenzrelation** \sim ist eine reflexive, symmetrische, transitive Relation

Definition

- x und y heißen **äquivalent**, wenn $(x, y) \in \sim$ bzw. $x \sim y$
- **Äquivalenzklasse** von x $[x] := \{y \in M \mid x \sim y\}$
- Elemente einer Äquivalenzklasse K heißen **Repräsentanten** von K
- **Repräsentantensystem** von \sim enthält aus jeder Äquivalenzklasse genau ein Element

Äquivalenzrelationen

Definition

Eine **Äquivalenzrelation** \sim ist eine reflexive, symmetrische, transitive Relation

Definition

- x und y heißen **äquivalent**, wenn $(x, y) \in \sim$ bzw. $x \sim y$
- **Äquivalenzklasse** von x $[x] := \{y \in M \mid x \sim y\}$
- Elemente einer Äquivalenzklasse K heißen **Repräsentanten** von K
- **Repräsentantensystem** von \sim enthält aus jeder Äquivalenzklasse genau ein Element

Bemerkung

Äquivalenzklasse umfasst alle Objekte mit gleichem Merkmal

Beispiel

R_1 und R_5 sind Äquivalenzrelationen

Beispiel

R_1 und R_5 sind Äquivalenzrelationen

Beispiel

Tripel aus \mathbb{B}^3 seien äquivalent, wenn sie durch Umordnen der Komponenten ineinander übergeführt werden können.

Beispiel

R_1 und R_5 sind Äquivalenzrelationen

Beispiel

Tripel aus \mathbb{B}^3 seien äquivalent, wenn sie durch Umordnen der Komponenten ineinander übergeführt werden können.

$$\sim = \{(000, 000), (001, 001), (001, 010), (001, 100), (010, 001), (010, 010), (010, 100), (100, 001), (100, 010), (100, 100), (011, 011), (011, 101), (011, 110), (101, 011), (101, 101), (101, 110), (110, 011), (110, 101), (110, 110), (111, 111)\}$$

bzw. 000

Beispiel

R_1 und R_5 sind Äquivalenzrelationen

Beispiel

Tripel aus \mathbb{B}^3 seien äquivalent, wenn sie durch Umordnen der Komponenten ineinander übergeführt werden können.

$$\sim = \{(000, 000), (001, 001), (001, 010), (001, 100), (010, 001), (010, 010), (010, 100), (100, 001), (100, 010), (100, 100), (011, 011), (011, 101), (011, 110), (101, 011), (101, 101), (101, 110), (110, 011), (110, 101), (110, 110), (111, 111)\}$$

bzw. $000, 001 \sim 010 \sim 100$

Beispiel

R_1 und R_5 sind Äquivalenzrelationen

Beispiel

Tripel aus \mathbb{B}^3 seien äquivalent, wenn sie durch Umordnen der Komponenten ineinander übergeführt werden können.

$$\sim = \{(000, 000), (001, 001), (001, 010), (001, 100), (010, 001), (010, 010), (010, 100), (100, 001), (100, 010), (100, 100), (011, 011), (011, 101), (011, 110), (101, 011), (101, 101), (101, 110), (110, 011), (110, 101), (110, 110), (111, 111)\}$$

bzw. $000, 001 \sim 010 \sim 100, 011 \sim 101 \sim 110$

Beispiel

R_1 und R_5 sind Äquivalenzrelationen

Beispiel

Tripel aus \mathbb{B}^3 seien äquivalent, wenn sie durch Umordnen der Komponenten ineinander übergeführt werden können.

$$\sim = \{(000, 000), (001, 001), (001, 010), (001, 100), (010, 001), (010, 010), (010, 100), (100, 001), (100, 010), (100, 100), (011, 011), (011, 101), (011, 110), (101, 011), (101, 101), (101, 110), (110, 011), (110, 101), (110, 110), (111, 111)\}$$

bzw. $000, 001 \sim 010 \sim 100, 011 \sim 101 \sim 110, 111$

Beispiel

R_1 und R_5 sind Äquivalenzrelationen

Beispiel

Tripel aus \mathbb{B}^3 seien äquivalent, wenn sie durch Umordnen der Komponenten ineinander übergeführt werden können.

$$\sim = \{(000, 000), (001, 001), (001, 010), (001, 100), (010, 001), (010, 010), (010, 100), (100, 001), (100, 010), (100, 100), (011, 011), (011, 101), (011, 110), (101, 011), (101, 101), (101, 110), (110, 011), (110, 101), (110, 110), (111, 111)\}$$

bzw. $000, 001 \sim 010 \sim 100, 011 \sim 101 \sim 110, 111$

Äquivalenzklassen: $\{000\}, \{001, 010, 100\}, \{011, 101, 110\}, \{111\}$

Beispiel

R_1 und R_5 sind Äquivalenzrelationen

Beispiel

Tripel aus \mathbb{B}^3 seien äquivalent, wenn sie durch Umordnen der Komponenten ineinander übergeführt werden können.

$$\sim = \{(000, 000), (001, 001), (001, 010), (001, 100), (010, 001), (010, 010), (010, 100), (100, 001), (100, 010), (100, 100), (011, 011), (011, 101), (011, 110), (101, 011), (101, 101), (101, 110), (110, 011), (110, 101), (110, 110), (111, 111)\}$$

bzw. $000, 001 \sim 010 \sim 100, 011 \sim 101 \sim 110, 111$

Äquivalenzklassen: $\{000\}, \{001, 010, 100\}, \{011, 101, 110\}, \{111\}$

Repräsentantensysteme: $\{000, 001, 011, 111\}, \{000, 010, 011, 111\}, \dots$

Satz

$x \sim z \Leftrightarrow [x] = [z]$ für Äquivalenzrelation \sim

Satz

$x \sim z \Leftrightarrow [x] = [z]$ für Äquivalenzrelation \sim

Beweis.

- \Rightarrow (wir zeigen $[x] \subseteq [z]$; andere Inklusion analog)

Satz

$x \sim z \Leftrightarrow [x] = [z]$ für Äquivalenzrelation \sim

Beweis.

- \Rightarrow (wir zeigen $[x] \subseteq [z]$; andere Inklusion analog)
 $x \sim z$ und $y \in [x]$

Satz

$x \sim z \Leftrightarrow [x] = [z]$ für Äquivalenzrelation \sim

Beweis.

- \Rightarrow (wir zeigen $[x] \subseteq [z]$; andere Inklusion analog)
 $x \sim z$ und $y \in [x] \Rightarrow z \sim x$ (Symmetrie)

Satz

$x \sim z \Leftrightarrow [x] = [z]$ für Äquivalenzrelation \sim

Beweis.

- \Rightarrow (wir zeigen $[x] \subseteq [z]$; andere Inklusion analog)
 $x \sim z$ und $y \in [x] \Rightarrow z \sim x$ (Symmetrie) $\Rightarrow x \sim y$ (Def. ÄK)

Satz

$x \sim z \Leftrightarrow [x] = [z]$ für Äquivalenzrelation \sim

Beweis.

- \Rightarrow (wir zeigen $[x] \subseteq [z]$; andere Inklusion analog)
 $x \sim z$ und $y \in [x] \Rightarrow z \sim x$ (Symmetrie) $\Rightarrow x \sim y$ (Def. ÄK) $\Rightarrow z \sim y$ (Transitivität)

Satz

$x \sim z \Leftrightarrow [x] = [z]$ für Äquivalenzrelation \sim

Beweis.

- \Rightarrow (wir zeigen $[x] \subseteq [z]$; andere Inklusion analog)
 $x \sim z$ und $y \in [x] \Rightarrow z \sim x$ (Symmetrie) $\Rightarrow x \sim y$ (Def. ÄK) $\Rightarrow z \sim y$ (Transitivität)
 $\Rightarrow y \in [z]$ (Def. ÄK)

Satz

$x \sim z \Leftrightarrow [x] = [z]$ für Äquivalenzrelation \sim

Beweis.

- \Rightarrow (wir zeigen $[x] \subseteq [z]$; andere Inklusion analog)
 $x \sim z$ und $y \in [x] \Rightarrow z \sim x$ (Symmetrie) $\Rightarrow x \sim y$ (Def. ÄK) $\Rightarrow z \sim y$ (Transitivität)
 $\Rightarrow y \in [z]$ (Def. ÄK)
- $\Leftarrow [x] = [z]$

Satz

$x \sim z \Leftrightarrow [x] = [z]$ für Äquivalenzrelation \sim

Beweis.

- \Rightarrow (wir zeigen $[x] \subseteq [z]$; andere Inklusion analog)
 $x \sim z$ und $y \in [x] \Rightarrow z \sim x$ (Symmetrie) $\Rightarrow x \sim y$ (Def. ÄK) $\Rightarrow z \sim y$ (Transitivität)
 $\Rightarrow y \in [z]$ (Def. ÄK)
- $\Leftarrow [x] = [z] \Rightarrow \{y \mid x \sim y\} = \{y \mid z \sim y\}$

Satz

$x \sim z \Leftrightarrow [x] = [z]$ für Äquivalenzrelation \sim

Beweis.

- \Rightarrow (wir zeigen $[x] \subseteq [z]$; andere Inklusion analog)
 $x \sim z$ und $y \in [x] \Rightarrow z \sim x$ (Symmetrie) $\Rightarrow x \sim y$ (Def. ÄK) $\Rightarrow z \sim y$ (Transitivität)
 $\Rightarrow y \in [z]$ (Def. ÄK)
- $\Leftarrow [x] = [z] \Rightarrow \{y \mid x \sim y\} = \{y \mid z \sim y\} \Rightarrow x \sim z$

Satz

$x \sim z \Leftrightarrow [x] = [z]$ für Äquivalenzrelation \sim

Beweis.

- \Rightarrow (wir zeigen $[x] \subseteq [z]$; andere Inklusion analog)
 $x \sim z$ und $y \in [x] \Rightarrow z \sim x$ (Symmetrie) $\Rightarrow x \sim y$ (Def. ÄK) $\Rightarrow z \sim y$ (Transitivität)
 $\Rightarrow y \in [z]$ (Def. ÄK)
- $\Leftarrow [x] = [z] \Rightarrow \{y \mid x \sim y\} = \{y \mid z \sim y\} \Rightarrow x \sim z$

Lemma

Sei $f: M \rightarrow N$ Abbildung. Dann wird durch

$$x \sim z :\Leftrightarrow f(x) = f(z)$$

eine Äquivalenzrelation definiert. Die Äquivalenzklassen sind die Urbildmengen $f^{-1}(y) = \{x \in M \mid f(x) = y\}$ mit $y \in f(M)$.

Definition

$\{B_1, \dots, B_n\}$ ist **Partition** von M , wenn $B_1 \uplus \dots \uplus B_n = M$

Definition

$\{B_1, \dots, B_n\}$ ist Partition von M , wenn $B_1 \uplus \dots \uplus B_n = M$

B_i heißen **Blöcke**

Definition

$\{B_1, \dots, B_n\}$ ist Partition von M , wenn $B_1 \uplus \dots \uplus B_n = M$

B_i heißen Blöcke

Beispiel

$\{\{000\}, \{001, 010, 100\}, \{011, 101, 110\}, \{111\}\}$ ist Partition von \mathbb{B}^3

Definition

$\{B_1, \dots, B_n\}$ ist Partition von M , wenn $B_1 \uplus \dots \uplus B_n = M$

B_i heißen Blöcke

Beispiel

$\{\{000\}, \{001, 010, 100\}, \{011, 101, 110\}, \{111\}\}$ ist Partition von \mathbb{B}^3

Satz

(1) Sei P Partition von M . Dann ist \sim Äquivalenzrelation auf M , mit

$x \sim y : \Leftrightarrow x$ und y liegen im gleichen Block von P

Definition

$\{B_1, \dots, B_n\}$ ist Partition von M , wenn $B_1 \uplus \dots \uplus B_n = M$

B_i heißen Blöcke

Beispiel

$\{\{000\}, \{001, 010, 100\}, \{011, 101, 110\}, \{111\}\}$ ist Partition von \mathbb{B}^3

Satz

(1) Sei P Partition von M . Dann ist \sim Äquivalenzrelation auf M , mit

$$x \sim y :\Leftrightarrow x \text{ und } y \text{ liegen im gleichen Block von } P$$

(2) Sei \sim eine Äquivalenzrelation auf M . Dann ist die Menge P aller Äquivalenzklassen bezüglich \sim eine Partition von M

Definition

$\{B_1, \dots, B_n\}$ ist Partition von M , wenn $B_1 \uplus \dots \uplus B_n = M$

B_i heißen Blöcke

Beispiel

$\{\{000\}, \{001, 010, 100\}, \{011, 101, 110\}, \{111\}\}$ ist Partition von \mathbb{B}^3

Satz

(1) Sei P Partition von M . Dann ist \sim Äquivalenzrelation auf M , mit

$$x \sim y :\Leftrightarrow x \text{ und } y \text{ liegen im gleichen Block von } P$$

(2) Sei \sim eine Äquivalenzrelation auf M . Dann ist die Menge P aller Äquivalenzklassen bezüglich \sim eine Partition von M

(3) Die Abbildungen $P \mapsto \sim$ aus (1) und $\sim \mapsto P$ aus (2) sind zueinander invers

Partielle Ordnungen

Definition

(partielle) Ordnung \leq ist reflexive, antisymmetrische, transitive Relation

Partielle Ordnungen

Definition

(partielle) Ordnung \leq ist reflexive, antisymmetrische, transitive Relation

Definition

$x \leq y$ wenn $(x, y) \in \leq$

Partielle Ordnungen

Definition

(partielle) Ordnung \leq ist reflexive, antisymmetrische, transitive Relation

Definition

$x \leq y$ wenn $(x, y) \in \leq$ $x < y$ wenn $x \leq y$ und $x \neq y$

Partielle Ordnungen

Definition

(partielle) Ordnung \leq ist reflexive, antisymmetrische, transitive Relation

Definition

$x \leq y$ wenn $(x, y) \in \leq$ $x < y$ wenn $x \leq y$ und $x \neq y$

x ist **Vorgänger** von y wenn $x < y$

Partielle Ordnungen

Definition

(partielle) Ordnung \leq ist reflexive, antisymmetrische, transitive Relation

Definition

$x \leq y$ wenn $(x, y) \in \leq$ $x < y$ wenn $x \leq y$ und $x \neq y$
 x ist Vorgänger von y wenn $x < y$ (y ist **Nachfolger** von x)

Partielle Ordnungen

Definition

(partielle) Ordnung \leq ist reflexive, antisymmetrische, transitive Relation

Definition

$x \leq y$ wenn $(x, y) \in \leq$ $x < y$ wenn $x \leq y$ und $x \neq y$
 x ist Vorgänger von y wenn $x < y$ (y ist Nachfolger von x)

Definition

Ordnung \leq heißt **total (linear)**, wenn für alle x, y

$$x = y \text{ oder } x < y \text{ oder } y < x$$

Partielle Ordnungen

Definition

(partielle) Ordnung \leq ist reflexive, antisymmetrische, transitive Relation

Definition

$x \leq y$ wenn $(x, y) \in \leq$ $x < y$ wenn $x \leq y$ und $x \neq y$
 x ist Vorgänger von y wenn $x < y$ (y ist Nachfolger von x)

Definition

Ordnung \leq heißt total (linear), wenn für alle x, y
 $x = y$ oder $x < y$ oder $y < x$

Satz

Wenn R partielle bzw. totale Ordnung auf M ist und $N \subseteq M$, dann ist $R \cap (N \times N)$ partielle bzw. totale Ordnung auf N

Beispiel

Die natürliche Ordnung \leq auf \mathbb{Z} , definiert durch

$$x \leq y \text{ genau dann, wenn } y - x \in \mathbb{N}$$

ist eine totale Ordnung

Beispiel

Die natürliche Ordnung \leq auf \mathbb{Z} , definiert durch

$$x \leq y \text{ genau dann, wenn } y - x \in \mathbb{N}$$

ist eine totale Ordnung

Beispiel

$m \in \mathbb{N}$ **teilt** $n \in \mathbb{N}$, wenn es $p \in \mathbb{N}$ gibt, sodass

$$n = m \cdot p$$

Teilbarkeitsordnung auf \mathbb{N} ist partielle, aber keine totale Ordnung auf \mathbb{N}

Beispiel

Die natürliche Ordnung \leq auf \mathbb{Z} , definiert durch

$$x \leq y \text{ genau dann, wenn } y - x \in \mathbb{N}$$

ist eine totale Ordnung

Beispiel

$m \in \mathbb{N}$ teilt $n \in \mathbb{N}$, wenn es $p \in \mathbb{N}$ gibt, sodass

$$n = m \cdot p$$

Teilbarkeitsordnung auf \mathbb{N} ist partielle, aber keine totale Ordnung auf \mathbb{N}

Beispiel

Die natürliche Ordnung \leq auf \mathbb{Z} , definiert durch

$$x \leq y \text{ genau dann, wenn } y - x \in \mathbb{N}$$

ist eine totale Ordnung

Beispiel

$m \in \mathbb{N}$ teilt $n \in \mathbb{N}$, wenn es $p \in \mathbb{N}$ gibt, sodass

$$n = m \cdot p$$

Teilbarkeitsordnung auf \mathbb{N} ist partielle, aber keine totale Ordnung auf \mathbb{N}

Beispiel

\leq partielle Ordnung auf M

Für Tupel $x = (x_1, x_2, \dots, x_k)$ und $y = (y_1, y_2, \dots, y_k)$ in M^k sei

$$x \leq_{\text{komp}} y \text{ genau dann, wenn } x_i \leq y_i \text{ für alle } i = 1, \dots, k$$

Die komponentenweise Erweiterung von \leq , \leq_{komp} ist eine partielle Ordnung

Beispiel

Die natürliche Ordnung \leq auf \mathbb{Z} , definiert durch

$$x \leq y \text{ genau dann, wenn } y - x \in \mathbb{N}$$

ist eine totale Ordnung

Beispiel

$m \in \mathbb{N}$ teilt $n \in \mathbb{N}$, wenn es $p \in \mathbb{N}$ gibt, sodass

$$n = m \cdot p$$

Teilbarkeitsordnung auf \mathbb{N} ist partielle, aber keine totale Ordnung auf \mathbb{N}

Beispiel

\leq partielle Ordnung auf M

Für Tupel $x = (x_1, x_2, \dots, x_k)$ und $y = (y_1, y_2, \dots, y_k)$ in M^k sei

$$x \leq y \text{ genau dann, wenn } x_i \leq y_i \text{ für alle } i = 1, \dots, k$$

Die **komponentenweise Erweiterung von \leq** , \leq_{komp} ist eine partielle Ordnung

Definition

$\mathcal{P}(M) := \{T \mid T \subseteq M\}$ Potenzmenge von M

Definition

$\mathcal{P}(M) := \{T \mid T \subseteq M\}$ Potenzmenge von M

$\mathcal{P}_k(M) := \{T \mid T \subseteq M \text{ und } \#(T) = k\}$ **k -elementige Teilmengen**

Definition

$\mathcal{P}(M) := \{T \mid T \subseteq M\}$ Potenzmenge von M

$\mathcal{P}_k(M) := \{T \mid T \subseteq M \text{ und } \#(T) = k\}$ k -elementige Teilmengen

Beispiel

$$\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$

Definition

$\mathcal{P}(M) := \{T \mid T \subseteq M\}$ Potenzmenge von M

$\mathcal{P}_k(M) := \{T \mid T \subseteq M \text{ und } \#(T) = k\}$ k -elementige Teilmengen

Beispiel

$\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ $\mathcal{P}_1(\{a, b\}) = \{\{a\}, \{b\}\}$

Definition

$\mathcal{P}(M) := \{T \mid T \subseteq M\}$ Potenzmenge von M

$\mathcal{P}_k(M) := \{T \mid T \subseteq M \text{ und } \#(T) = k\}$ k -elementige Teilmengen

Beispiel

$\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ $\mathcal{P}_1(\{a, b\}) = \{\{a\}, \{b\}\}$

Satz

Teilmengenrelation (Inklusion) $S \subseteq T$ ist partielle Ordnung auf $\mathcal{P}(M)$

Definition

$\mathcal{P}(M) := \{T \mid T \subseteq M\}$ Potenzmenge von M

$\mathcal{P}_k(M) := \{T \mid T \subseteq M \text{ und } \#(T) = k\}$ k -elementige Teilmengen

Beispiel

$\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ $\mathcal{P}_1(\{a, b\}) = \{\{a\}, \{b\}\}$

Satz

Teilmengenrelation (Inklusion) $S \subseteq T$ ist partielle Ordnung auf $\mathcal{P}(M)$

Definition (Verfeinerung und Vergrößerung von Partitionen)

Seien P, Q Partitionen von M

$P \leq Q :\Leftrightarrow$ jeder Block von P ist Teilmenge eines Blocks von Q

Definition

$\mathcal{P}(M) := \{T \mid T \subseteq M\}$ Potenzmenge von M

$\mathcal{P}_k(M) := \{T \mid T \subseteq M \text{ und } \#(T) = k\}$ k -elementige Teilmengen

Beispiel

$\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ $\mathcal{P}_1(\{a, b\}) = \{\{a\}, \{b\}\}$

Satz

Teilmengenrelation (Inklusion) $S \subseteq T$ ist partielle Ordnung auf $\mathcal{P}(M)$

Definition (Verfeinerung und Vergrößerung von Partitionen)

Seien P, Q Partitionen von M

$P \leq Q :\Leftrightarrow$ jeder Block von P ist Teilmenge eines Blocks von Q

Wenn $P < Q$, dann heißt P **feiner** als Q (Q **größer** als P)

Definition

$\mathcal{P}(M) := \{T \mid T \subseteq M\}$ Potenzmenge von M

$\mathcal{P}_k(M) := \{T \mid T \subseteq M \text{ und } \#(T) = k\}$ k -elementige Teilmengen

Beispiel

$\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ $\mathcal{P}_1(\{a, b\}) = \{\{a\}, \{b\}\}$

Satz

Teilmengenrelation (Inklusion) $S \subseteq T$ ist partielle Ordnung auf $\mathcal{P}(M)$

Definition (Verfeinerung und Vergrößerung von Partitionen)

Seien P, Q Partitionen von M

$P \leq Q :\Leftrightarrow$ jeder Block von P ist Teilmenge eines Blocks von Q

Wenn $P < Q$, dann heißt P feiner als Q (Q gröber als P)

Beispiel

Partition $\{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}$ ist feiner als jede der Partitionen

$\{\{a\}, \{b, c\}\}$ $\{\{b\}, \{a, c\}\}$ $\{\{c\}, \{a, b\}\}$ $\{\{a, b, c\}\}$

Satz

(1) \leq partielle Ordnung \Rightarrow Vorgängerrelation $<$ irreflexiv und transitiv

Satz

(1) \leq partielle Ordnung \Rightarrow Vorgängerrelation $<$ irreflexiv und transitiv

(2) Wenn R irreflexive und transitive Relation, dann definiert

$$x \leq y \Leftrightarrow x R y \text{ oder } x = y$$

partielle Ordnung

Satz

(1) \leq partielle Ordnung \Rightarrow Vorgängerrelation $<$ irreflexiv und transitiv

(2) Wenn R irreflexive und transitive Relation, dann definiert

$$x \leq y \Leftrightarrow x R y \text{ oder } x = y$$

partielle Ordnung

(3) Abbildungen $\leq \mapsto <$ aus (1) und $R \mapsto \leq$ aus (2) sind invers

Satz

(1) \leq partielle Ordnung \Rightarrow Vorgängerrelation $<$ irreflexiv und transitiv

(2) Wenn R irreflexive und transitive Relation, dann definiert

$$x \leq y \Leftrightarrow x R y \text{ oder } x = y$$

partielle Ordnung

(3) Abbildungen $\leq \mapsto <$ aus (1) und $R \mapsto \leq$ aus (2) sind invers

Bemerkung

partielle Ordnung kann über irreflexive und transitive Relation definiert werden

Satz

(1) \leq partielle Ordnung \Rightarrow Vorgängerrelation $<$ irreflexiv und transitiv

(2) Wenn R irreflexive und transitive Relation, dann definiert

$$x \leq y \Leftrightarrow x R y \text{ oder } x = y$$

partielle Ordnung

(3) Abbildungen $\leq \mapsto <$ aus (1) und $R \mapsto \leq$ aus (2) sind invers

Bemerkung

partielle Ordnung kann über irreflexive und transitive Relation definiert werden

Beispiel

$< = \{(0, 1), (1, 2), (0, 2)\}$ definiert partielle Ordnung

Satz

(1) \leq partielle Ordnung \Rightarrow Vorgängerrelation $<$ irreflexiv und transitiv

(2) Wenn R irreflexive und transitive Relation, dann definiert

$$x \leq y \Leftrightarrow x R y \text{ oder } x = y$$

partielle Ordnung

(3) Abbildungen $\leq \mapsto <$ aus (1) und $R \mapsto \leq$ aus (2) sind invers

Bemerkung

partielle Ordnung kann über irreflexive und transitive Relation definiert werden

Beispiel

$< = \{(0, 1), (1, 2), (0, 2)\}$ definiert partielle Ordnung

$\leq = \{(0, 1), (1, 2), (0, 2)\}$

Satz

(1) \leq partielle Ordnung \Rightarrow Vorgängerrelation $<$ irreflexiv und transitiv

(2) Wenn R irreflexive und transitive Relation, dann definiert

$$x \leq y \Leftrightarrow x R y \text{ oder } x = y$$

partielle Ordnung

(3) Abbildungen $\leq \mapsto <$ aus (1) und $R \mapsto \leq$ aus (2) sind invers

Bemerkung

partielle Ordnung kann über irreflexive und transitive Relation definiert werden

Beispiel

$< = \{(0, 1), (1, 2), (0, 2)\}$ definiert partielle Ordnung

$\leq = \{(0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 2), (0, 2), (2, 2)\}$

Beweis.

(1) Nach Definition gilt $x < y$ genau dann, wenn $x \leq y$ und $x \neq y$. Somit ist $<$ irreflexiv.



Beweis.

(1) Nach Definition gilt $x < y$ genau dann, wenn $x \leq y$ und $x \neq y$. Somit ist $<$ irreflexiv. Um die Transitivität von $<$ zu zeigen, seien $x < y$ und $y < z$.



Beweis.

(1) Nach Definition gilt $x < y$ genau dann, wenn $x \leq y$ und $x \neq y$. Somit ist $<$ irreflexiv. Um die Transitivität von $<$ zu zeigen, seien $x < y$ und $y < z$. Aus der Transitivität von \leq folgt $x \leq z$.

Beweis.

(1) Nach Definition gilt $x < y$ genau dann, wenn $x \leq y$ und $x \neq y$. Somit ist $<$ irreflexiv. Um die Transitivität von $<$ zu zeigen, seien $x < y$ und $y < z$. Aus der Transitivität von \leq folgt $x \leq z$. Wegen der Antisymmetrie von \leq kann x nicht gleich z sein.

Beweis.

(1) Nach Definition gilt $x < y$ genau dann, wenn $x \leq y$ und $x \neq y$. Somit ist $<$ irreflexiv. Um die Transitivität von $<$ zu zeigen, seien $x < y$ und $y < z$. Aus der Transitivität von \leq folgt $x \leq z$. Wegen der Antisymmetrie von \leq kann x nicht gleich z sein. Daher ist $x < z$.



Beweis.

(1) Nach Definition gilt $x < y$ genau dann, wenn $x \leq y$ und $x \neq y$. Somit ist $<$ irreflexiv. Um die Transitivität von $<$ zu zeigen, seien $x < y$ und $y < z$. Aus der Transitivität von \leq folgt $x \leq z$. Wegen der Antisymmetrie von \leq kann x nicht gleich z sein. Daher ist $x < z$.

(2) Nach Definition ist \leq reflexiv.

Beweis.

- (1) Nach Definition gilt $x < y$ genau dann, wenn $x \leq y$ und $x \neq y$. Somit ist $<$ irreflexiv. Um die Transitivität von $<$ zu zeigen, seien $x < y$ und $y < z$. Aus der Transitivität von \leq folgt $x \leq z$. Wegen der Antisymmetrie von \leq kann x nicht gleich z sein. Daher ist $x < z$.
- (2) Nach Definition ist \leq reflexiv. Nun zeigen wir Transitivität. Gelte $x, y, z \in M$ mit $x \leq y$ und $y \leq z$.

Beweis.

(1) Nach Definition gilt $x < y$ genau dann, wenn $x \leq y$ und $x \neq y$. Somit ist $<$ irreflexiv. Um die Transitivität von $<$ zu zeigen, seien $x < y$ und $y < z$. Aus der Transitivität von \leq folgt $x \leq z$. Wegen der Antisymmetrie von \leq kann x nicht gleich z sein. Daher ist $x < z$.

(2) Nach Definition ist \leq reflexiv. Nun zeigen wir Transitivität. Gelte $x, y, z \in M$ mit $x \leq y$ und $y \leq z$. Wenn $x = y$ und $y = z$ ist, dann folgt $x = z$. In den anderen Fällen gilt $x R z$, wobei wir im Fall dass $x R y$ und $y R z$ die Transitivität von R verwenden.

Beweis.

(1) Nach Definition gilt $x < y$ genau dann, wenn $x \leq y$ und $x \neq y$. Somit ist $<$ irreflexiv. Um die Transitivität von $<$ zu zeigen, seien $x < y$ und $y < z$. Aus der Transitivität von \leq folgt $x \leq z$. Wegen der Antisymmetrie von \leq kann x nicht gleich z sein. Daher ist $x < z$.

(2) Nach Definition ist \leq reflexiv. Nun zeigen wir Transitivität. Gelte $x, y, z \in M$ mit $x \leq y$ und $y \leq z$. Wenn $x = y$ und $y = z$ ist, dann folgt $x = z$. In den anderen Fällen gilt $x R z$, wobei wir im Fall dass $x R y$ und $y R z$ die Transitivität von R verwenden. Um die Antisymmetrie von \leq einzusehen, genügt es zu sehen, dass $x \leq y$ und $y \leq x$ nur gelten kann, wenn $x = y$ (und $y = x$)

Beweis.

(1) Nach Definition gilt $x < y$ genau dann, wenn $x \leq y$ und $x \neq y$. Somit ist $<$ irreflexiv. Um die Transitivität von $<$ zu zeigen, seien $x < y$ und $y < z$. Aus der Transitivität von \leq folgt $x \leq z$. Wegen der Antisymmetrie von \leq kann x nicht gleich z sein. Daher ist $x < z$.

(2) Nach Definition ist \leq reflexiv. Nun zeigen wir Transitivität. Gelte $x, y, z \in M$ mit $x \leq y$ und $y \leq z$. Wenn $x = y$ und $y = z$ ist, dann folgt $x = z$. In den anderen Fällen gilt $x R z$, wobei wir im Fall dass $x R y$ und $y R z$ die Transitivität von R verwenden. Um die Antisymmetrie von \leq einzusehen, genügt es zu sehen, dass $x \leq y$ und $y \leq x$ nur gelten kann, wenn $x = y$ (und $y = x$); die anderen Fälle stehen im Widerspruch zur Irreflexivität von R

Beweis.

(1) Nach Definition gilt $x < y$ genau dann, wenn $x \leq y$ und $x \neq y$. Somit ist $<$ irreflexiv. Um die Transitivität von $<$ zu zeigen, seien $x < y$ und $y < z$. Aus der Transitivität von \leq folgt $x \leq z$. Wegen der Antisymmetrie von \leq kann x nicht gleich z sein. Daher ist $x < z$.

(2) Nach Definition ist \leq reflexiv. Nun zeigen wir Transitivität. Gelte $x, y, z \in M$ mit $x \leq y$ und $y \leq z$. Wenn $x = y$ und $y = z$ ist, dann folgt $x = z$. In den anderen Fällen gilt $x R z$, wobei wir im Fall dass $x R y$ und $y R z$ die Transitivität von R verwenden. Um die Antisymmetrie von \leq einzusehen, genügt es zu sehen, dass $x \leq y$ und $y \leq x$ nur gelten kann, wenn $x = y$ (und $y = x$); die anderen Fälle stehen im Widerspruch zur Irreflexivität von R .

(3) Wenn man von einer partiellen Ordnung \leq ausgeht, dann bekommt man durch $x < y \vee x = y$ die partielle Ordnung $x \leq y$ zurück.

Beweis.

(1) Nach Definition gilt $x < y$ genau dann, wenn $x \leq y$ und $x \neq y$. Somit ist $<$ irreflexiv. Um die Transitivität von $<$ zu zeigen, seien $x < y$ und $y < z$. Aus der Transitivität von \leq folgt $x \leq z$. Wegen der Antisymmetrie von \leq kann x nicht gleich z sein. Daher ist $x < z$.

(2) Nach Definition ist \leq reflexiv. Nun zeigen wir Transitivität. Gelte $x, y, z \in M$ mit $x \leq y$ und $y \leq z$. Wenn $x = y$ und $y = z$ ist, dann folgt $x = z$. In den anderen Fällen gilt $x R z$, wobei wir im Fall dass $x R y$ und $y R z$ die Transitivität von R verwenden. Um die Antisymmetrie von \leq einzusehen, genügt es zu sehen, dass $x \leq y$ und $y \leq x$ nur gelten kann, wenn $x = y$ (und $y = x$); die anderen Fälle stehen im Widerspruch zur Irreflexivität von R .

(3) Wenn man von einer partiellen Ordnung \leq ausgeht, dann bekommt man durch $x < y \vee x = y$ die partielle Ordnung $x \leq y$ zurück. Wenn man von einer irreflexiven und transitiven Relation R ausgeht, dann bekommt man durch $x \leq y \wedge x \neq y$ die Relation R zurück. ■

Definition

Sei \leq partielle Ordnung auf M . Dann heißt $x \in M$

- **kleinstes Element** von M , falls für alle $y \in M$ mit $x \leq y$
- größtes Element von M , falls für alle $y \in M$ mit $y \leq x$
- minimales Element von M , falls für alle $y \in M$ mit $y \neq x$ ist $y \not\leq x$
- maximales Element von M , falls für alle $y \in M$ mit $y \neq x$ ist $x \not\leq y$

Definition

Sei \leq partielle Ordnung auf M . Dann heißt $x \in M$

- kleinstes Element von M , falls für alle $y \in M$ mit $x \leq y$
- **größtes Element** von M , falls für alle $y \in M$ mit $y \leq x$
- minimales Element von M , falls für alle $y \in M$ mit $y \neq x$ ist $y \not\leq x$
- maximales Element von M , falls für alle $y \in M$ mit $y \neq x$ ist $x \not\leq y$

Definition

Sei \leq partielle Ordnung auf M . Dann heißt $x \in M$

- kleinstes Element von M , falls für alle $y \in M$ mit $x \leq y$
- größtes Element von M , falls für alle $y \in M$ mit $y \leq x$
- **minimales Element** von M , falls für alle $y \in M$ mit $y \neq x$ ist $y \not\leq x$
- maximales Element von M , falls für alle $y \in M$ mit $y \neq x$ ist $x \not\leq y$

Definition

Sei \leq partielle Ordnung auf M . Dann heißt $x \in M$

- kleinstes Element von M , falls für alle $y \in M$ mit $x \leq y$
- größtes Element von M , falls für alle $y \in M$ mit $y \leq x$
- minimales Element von M , falls für alle $y \in M$ mit $y \neq x$ ist $y \not\leq x$
- **maximales Element** von M , falls für alle $y \in M$ mit $y \neq x$ ist $x \not\leq y$

Definition

- Sei \leq partielle Ordnung . Dann heißt x
- kleinstes Element , falls für alle y mit $x \leq y$
 - größtes Element , falls für alle y mit $y \leq x$
 - minimales Element , falls für alle y mit $y \neq x$ ist $y \not\leq x$
 - maximales Element , falls für alle y mit $y \neq x$ ist $x \not\leq y$

Definition

- Sei \leq partielle Ordnung . Dann heißt x
- kleinstes Element , falls für alle y mit $x \leq y$
 - größtes Element , falls für alle y mit $y \leq x$
 - minimales Element , falls für alle y mit $y \neq x$ ist $y \not\leq x$
 - maximales Element , falls für alle y mit $y \neq x$ ist $x \not\leq y$

Beispiel

\leq gegeben durch Vorgängerrelation

$$\leq = \{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5)\}$$

- minimale Elemente:
- maximale Elemente:
- kleinstes Element:
- größtes Element:

Definition

- Sei \leq partielle Ordnung . Dann heißt x
- kleinstes Element , falls für alle y mit $x \leq y$
 - größtes Element , falls für alle y mit $y \leq x$
 - minimales Element , falls für alle y mit $y \neq x$ ist $y \not\leq x$
 - maximales Element , falls für alle y mit $y \neq x$ ist $x \not\leq y$

Beispiel

\leq gegeben durch Vorgängerrelation

$$\leq = \{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5)\}$$

- minimale Elemente: 1, 3
- maximale Elemente:
- kleinstes Element:
- größtes Element:

Definition

Sei \leq partielle Ordnung . Dann heißt x

- kleinstes Element , falls für alle y mit $x \leq y$
- größtes Element , falls für alle y mit $y \leq x$
- minimales Element , falls für alle y mit $y \neq x$ ist $y \not\leq x$
- maximales Element , falls für alle y mit $y \neq x$ ist $x \not\leq y$

Beispiel

\leq gegeben durch Vorgängerrelation

$$\leq = \{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5)\}$$

- minimale Elemente: 1, 3
- maximale Elemente: 5
- kleinstes Element:
- größtes Element:

Definition

- Sei \leq partielle Ordnung . Dann heißt x
- kleinstes Element , falls für alle y mit $x \leq y$
 - größtes Element , falls für alle y mit $y \leq x$
 - minimales Element , falls für alle y mit $y \neq x$ ist $y \not\leq x$
 - maximales Element , falls für alle y mit $y \neq x$ ist $x \not\leq y$

Beispiel

\leq gegeben durch Vorgängerrelation

$$\leq = \{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5)\}$$

- minimale Elemente: 1, 3
- maximale Elemente: 5
- kleinstes Element:
- größtes Element:

Definition

- Sei \leq partielle Ordnung . Dann heißt x
- kleinstes Element , falls für alle y mit $x \leq y$
 - größtes Element , falls für alle y mit $y \leq x$
 - minimales Element , falls für alle y mit $y \neq x$ ist $y \not\leq x$
 - maximales Element , falls für alle y mit $y \neq x$ ist $x \not\leq y$

Beispiel

\leq gegeben durch Vorgängerrelation

$$< = \{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5)\}$$

- minimale Elemente: 1, 3
- maximale Elemente: 5
- kleinstes Element:
- größtes Element: 5

Lemma

\leq totale Ordnung

- x kleinstes Element $\Leftrightarrow x$ minimales Element
- x größtes Element $\Leftrightarrow x$ maximales Element

Lemma

\leq totale Ordnung

- x kleinstes Element $\Leftrightarrow x$ minimales Element
- x größtes Element $\Leftrightarrow x$ maximales Element

Satz

\leq partielle Ordnung

- (1) x kleinstes Element $\Rightarrow x$ eindeutig, x einziges minimales Element
- (2) x größtes Element $\Rightarrow x$ eindeutig, x einziges maximales Element

Lemma

\leq totale Ordnung

- x kleinstes Element $\Leftrightarrow x$ minimales Element
- x größtes Element $\Leftrightarrow x$ maximales Element

Satz

\leq partielle Ordnung

- (1) x kleinstes Element $\Rightarrow x$ eindeutig, x einziges minimales Element
- (2) x größtes Element $\Rightarrow x$ eindeutig, x einziges maximales Element

Beweis.

(1) eindeutig:



Lemma

\leq totale Ordnung

- x kleinstes Element $\Leftrightarrow x$ minimales Element
- x größtes Element $\Leftrightarrow x$ maximales Element

Satz

\leq partielle Ordnung

- (1) x kleinstes Element $\Rightarrow x$ eindeutig, x einziges minimales Element
- (2) x größtes Element $\Rightarrow x$ eindeutig, x einziges maximales Element

Beweis.

(1) eindeutig: x, w kleinste Elemente



Lemma

\leq totale Ordnung

- x kleinstes Element $\Leftrightarrow x$ minimales Element
- x größtes Element $\Leftrightarrow x$ maximales Element

Satz

\leq partielle Ordnung

- (1) x kleinstes Element $\Rightarrow x$ eindeutig, x einziges minimales Element
- (2) x größtes Element $\Rightarrow x$ eindeutig, x einziges maximales Element

Beweis.

(1) eindeutig: x, w kleinste Elemente $\Rightarrow w \leq x \leq w$



Lemma

\leq totale Ordnung

- x kleinstes Element $\Leftrightarrow x$ minimales Element
- x größtes Element $\Leftrightarrow x$ maximales Element

Satz

\leq partielle Ordnung

- (1) x kleinstes Element $\Rightarrow x$ eindeutig, x einziges minimales Element
- (2) x größtes Element $\Rightarrow x$ eindeutig, x einziges maximales Element

Beweis.

(1) eindeutig: x, w kleinste Elemente $\Rightarrow w \leq x \leq w \Rightarrow w = x$



Lemma

\leq totale Ordnung

- x kleinstes Element $\Leftrightarrow x$ minimales Element
- x größtes Element $\Leftrightarrow x$ maximales Element

Satz

\leq partielle Ordnung

- (1) x kleinstes Element $\Rightarrow x$ eindeutig, x einziges minimales Element
- (2) x größtes Element $\Rightarrow x$ eindeutig, x einziges maximales Element

Beweis.

(1) eindeutig: x, w kleinste Elemente $\Rightarrow w \leq x \leq w \Rightarrow w = x$
einziges min. Element:



Lemma

\leq totale Ordnung

- x kleinstes Element $\Leftrightarrow x$ minimales Element
- x größtes Element $\Leftrightarrow x$ maximales Element

Satz

\leq partielle Ordnung

- (1) x kleinstes Element $\Rightarrow x$ eindeutig, x einziges minimales Element
- (2) x größtes Element $\Rightarrow x$ eindeutig, x einziges maximales Element

Beweis.

(1) eindeutig: x, w kleinste Elemente $\Rightarrow w \leq x \leq w \Rightarrow w = x$
einziges min. Element: x kleinstes Element und $y \leq x$

Lemma

\leq totale Ordnung

- x kleinstes Element $\Leftrightarrow x$ minimales Element
- x größtes Element $\Leftrightarrow x$ maximales Element

Satz

\leq partielle Ordnung

- (1) x kleinstes Element $\Rightarrow x$ eindeutig, x einziges minimales Element
- (2) x größtes Element $\Rightarrow x$ eindeutig, x einziges maximales Element

Beweis.

(1) eindeutig: x, w kleinste Elemente $\Rightarrow w \leq x \leq w \Rightarrow w = x$
einziges min. Element: x kleinstes Element und $y \leq x \Rightarrow y \leq x \leq y$

Lemma

\leq totale Ordnung

- x kleinstes Element $\Leftrightarrow x$ minimales Element
- x größtes Element $\Leftrightarrow x$ maximales Element

Satz

\leq partielle Ordnung

- (1) x kleinstes Element $\Rightarrow x$ eindeutig, x einziges minimales Element
- (2) x größtes Element $\Rightarrow x$ eindeutig, x einziges maximales Element

Beweis.

(1) eindeutig: x, w kleinste Elemente $\Rightarrow w \leq x \leq w \Rightarrow w = x$
einziges min. Element: x kleinstes Element und $y \leq x \Rightarrow y \leq x \leq y \Rightarrow y = x$

Lemma

\leq totale Ordnung

- x kleinstes Element $\Leftrightarrow x$ minimales Element
- x größtes Element $\Leftrightarrow x$ maximales Element

Satz

\leq partielle Ordnung

- (1) x kleinstes Element $\Rightarrow x$ eindeutig, x einziges minimales Element
- (2) x größtes Element $\Rightarrow x$ eindeutig, x einziges maximales Element

Beweis.

- (1) eindeutig: x, w kleinste Elemente $\Rightarrow w \leq x \leq w \Rightarrow w = x$
einziges min. Element: x kleinstes Element und $y \leq x \Rightarrow y \leq x \leq y \Rightarrow y = x$
- (2) analog ■

Satz

- (3) *M endlich \Rightarrow es gibt zu jedem $x \in M$ minimales Element w mit $w \leq x$ und maximales Element z mit $x \leq z$*
- (4) *Wenn M endlich und nur ein minimales Element x besitzt, ist x kleinstes Element*
- (5) *Wenn M endlich und nur ein maximales Element x besitzt, ist x größtes Element*

Satz

- (3) *M endlich \Rightarrow es gibt zu jedem $x \in M$ minimales Element w mit $w \leq x$ und maximales Element z mit $x \leq z$*
- (4) *Wenn M endlich und nur ein minimales Element x besitzt, ist x kleinstes Element*
- (5) *Wenn M endlich und nur ein maximales Element x besitzt, ist x größtes Element*

Beweis.

(3) Wir zeigen nur die Existenz eines minimalen Elements:

Satz

- (3) *M endlich \Rightarrow es gibt zu jedem $x \in M$ minimales Element w mit $w \leq x$ und maximales Element z mit $x \leq z$*
- (4) *Wenn M endlich und nur ein minimales Element x besitzt, ist x kleinstes Element*
- (5) *Wenn M endlich und nur ein maximales Element x besitzt, ist x größtes Element*

Beweis.

(3) Wir zeigen nur die Existenz eines minimalen Elements: Wenn x minimal, ist man fertig.

Satz

- (3) *M endlich \Rightarrow es gibt zu jedem $x \in M$ minimales Element w mit $w \leq x$ und maximales Element z mit $x \leq z$*
- (4) *Wenn M endlich und nur ein minimales Element x besitzt, ist x kleinstes Element*
- (5) *Wenn M endlich und nur ein maximales Element x besitzt, ist x größtes Element*

Beweis.

(3) Wir zeigen nur die Existenz eines minimalen Elements: Wenn x minimal, ist man fertig. Sonst gibt es $x_1 \in M$ mit $x_1 < x$.

Satz

- (3) *M endlich \Rightarrow es gibt zu jedem $x \in M$ minimales Element w mit $w \leq x$ und maximales Element z mit $x \leq z$*
- (4) *Wenn M endlich und nur ein minimales Element x besitzt, ist x kleinstes Element*
- (5) *Wenn M endlich und nur ein maximales Element x besitzt, ist x größtes Element*

Beweis.

(3) Wir zeigen nur die Existenz eines minimalen Elements: Wenn x minimal, ist man fertig. Sonst gibt es $x_1 \in M$ mit $x_1 < x$. Wenn x_1 nicht minimal, gibt es $x_2 \in M$ mit $x_2 < x_1$, usw.

Satz

- (3) M endlich \Rightarrow es gibt zu jedem $x \in M$ minimales Element w mit $w \leq x$ und maximales Element z mit $x \leq z$
- (4) Wenn M endlich und nur ein minimales Element x besitzt, ist x kleinstes Element
- (5) Wenn M endlich und nur ein maximales Element x besitzt, ist x größtes Element

Beweis.

(3) Wir zeigen nur die Existenz eines minimalen Elements: Wenn x minimal, ist man fertig. Sonst gibt es $x_1 \in M$ mit $x_1 < x$. Wenn x_1 nicht minimal, gibt es $x_2 \in M$ mit $x_2 < x_1$, usw. Da

$$x > x_1 > x_2 > \dots$$

verschiedene Elemente von M sind, erreicht man nach endlich vielen Schritten ein minimales Element x_n mit $x_n < x$.

Satz

- (3) M endlich \Rightarrow es gibt zu jedem $x \in M$ minimales Element w mit $w \leq x$ und maximales Element z mit $x \leq z$
- (4) Wenn M endlich und nur ein minimales Element x besitzt, ist x kleinstes Element
- (5) Wenn M endlich und nur ein maximales Element x besitzt, ist x größtes Element

Beweis.

(3) Wir zeigen nur die Existenz eines minimalen Elements: Wenn x minimal, ist man fertig. Sonst gibt es $x_1 \in M$ mit $x_1 < x$. Wenn x_1 nicht minimal, gibt es $x_2 \in M$ mit $x_2 < x_1$, usw. Da

$$x > x_1 > x_2 > \dots$$

verschiedene Elemente von M sind, erreicht man nach endlich vielen Schritten ein minimales Element x_n mit $x_n < x$.

(4) und (5) folgen aus (3)

Das Wortmonoid

Definition (Alphabet)

Menge Σ heißt **Alphabet** $a \in \Sigma$ heißt Zeichen

Das Wortmonoid

Definition (Alphabet)

Menge Σ heißt Alphabet $a \in \Sigma$ heißt **Zeichen**

Das Wortmonoid

Definition (Alphabet)

Menge Σ heißt Alphabet $a \in \Sigma$ heißt Zeichen

Beispiel

- $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ ist das **binäre** Alphabet
- $\{a, b, \dots, z\}$ ist das Alphabet der (lateinischen) Kleinbuchstaben
- $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ist das Alphabet der (arabischen) Ziffern

Das Wortmonoid

Definition (Alphabet)

Menge Σ heißt Alphabet $a \in \Sigma$ heißt Zeichen

Beispiel

- $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ ist das binäre Alphabet
- $\{a, b, \dots, z\}$ ist das Alphabet der (lateinischen) **Kleinbuchstaben**
- $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ist das Alphabet der (arabischen) Ziffern

Das Wortmonoid

Definition (Alphabet)

Menge Σ heißt Alphabet $a \in \Sigma$ heißt Zeichen

Beispiel

- $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ ist das binäre Alphabet
- $\{a, b, \dots, z\}$ ist das Alphabet der (lateinischen) Kleinbuchstaben
- $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ist das Alphabet der (arabischen) **Ziffern**

Das Wortmonoid

Definition (Alphabet)

Menge Σ heißt Alphabet $a \in \Sigma$ heißt Zeichen

Beispiel

- $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ ist das binäre Alphabet
- $\{a, b, \dots, z\}$ ist das Alphabet der (lateinischen) Kleinbuchstaben
- $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ist das Alphabet der (arabischen) Ziffern

Definition (Wort)

$(w_0, \dots, w_{n-1}) \in \Sigma^n$ heißt **Wort (String) der Länge n** über Σ

Das Wortmonoid

Definition (Alphabet)

Menge Σ heißt Alphabet $a \in \Sigma$ heißt Zeichen

Beispiel

- $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ ist das binäre Alphabet
- $\{a, b, \dots, z\}$ ist das Alphabet der (lateinischen) Kleinbuchstaben
- $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ist das Alphabet der (arabischen) Ziffern

Definition (Wort)

$(w_0, \dots, w_{n-1}) \in \Sigma^n$ heißt Wort (String) der Länge n über Σ
 Σ^* ist die Menge aller Wörter über Σ

Definition (Verkettung, Konkatenation)

Für Wörter $v = (v_0, \dots, v_{m-1}) \in \Sigma^*$ und $w = (w_0, \dots, w_{n-1}) \in \Sigma^*$ ist die **Verkettung** (**Konkatenation**)

$$vw := (v_0, \dots, v_{m-1}, w_0, \dots, w_{n-1}) \in \Sigma^*$$

Definition (Verkettung, Konkatenation)

Für Wörter $v = (v_0, \dots, v_{m-1}) \in \Sigma^*$ und $w = (w_0, \dots, w_{n-1}) \in \Sigma^*$ ist die Verkettung (Konkatenation)

$$vw := (v_0, \dots, v_{m-1}, w_0, \dots, w_{n-1}) \in \Sigma^*$$

Lemma

Für Wörter $u, v, w \in \Sigma^*$ gilt $(uv)w = u(vw)$ *Assoziativgesetz*

Definition (Verkettung, Konkatenation)

Für Wörter $v = (v_0, \dots, v_{m-1}) \in \Sigma^*$ und $w = (w_0, \dots, w_{n-1}) \in \Sigma^*$ ist die Verkettung (Konkatenation)

$$vw := (v_0, \dots, v_{m-1}, w_0, \dots, w_{n-1}) \in \Sigma^*$$

Lemma

Für Wörter $u, v, w \in \Sigma^*$ gilt $(uv)w = u(vw)$ Assoziativgesetz und das **leere Wort** $\epsilon = ()$ ist das neutrale Element: $w\epsilon = \epsilon w = w$

Definition (Verkettung, Konkatenation)

Für Wörter $v = (v_0, \dots, v_{m-1}) \in \Sigma^*$ und $w = (w_0, \dots, w_{n-1}) \in \Sigma^*$ ist die Verkettung (Konkatenation)

$$vw := (v_0, \dots, v_{m-1}, w_0, \dots, w_{n-1}) \in \Sigma^*$$

Lemma

Für Wörter $u, v, w \in \Sigma^$ gilt $(uv)w = u(vw)$ Assoziativgesetz und das leere Wort $\epsilon = ()$ ist das neutrale Element: $w\epsilon = \epsilon w = w$*

Bemerkung

Wie in ETI lassen wir Klammern und Beistriche in Wörtern weg; Wörter der Länge 1 werden wie Zeichen geschrieben

Definition (Verkettung, Konkatenation)

Für Wörter $v = (v_0, \dots, v_{m-1}) \in \Sigma^*$ und $w = (w_0, \dots, w_{n-1}) \in \Sigma^*$ ist die Verkettung (Konkatenation)

$$vw := (v_0, \dots, v_{m-1}, w_0, \dots, w_{n-1}) \in \Sigma^*$$

Lemma

Für Wörter $u, v, w \in \Sigma^$ gilt $(uv)w = u(vw)$ Assoziativgesetz und das leere Wort $\epsilon = ()$ ist das neutrale Element: $w\epsilon = \epsilon w = w$*

Bemerkung

Wie in ETI lassen wir Klammern und Beistriche in Wörtern weg; Wörter der Länge 1 werden wie Zeichen geschrieben

Satz

Das Wortmonoid mit $\langle \Sigma^; \cdot, \epsilon \rangle$ ist ein Monoid, wobei \cdot Konkatenation und ϵ das Leerwort bezeichnet.*

Lemma

Für die **Längenfunktion** $\ell: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$, $(w_0, \dots, w_{n-1}) \mapsto n$

Lemma

Für die Längenfunktion $\ell: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$, $(w_0, \dots, w_{n-1}) \mapsto n$ gilt

$$\ell(vw) = \ell(v) + \ell(w) \quad \text{und} \quad \ell(\epsilon) = 0$$

Lemma

Für die Längenfunktion $\ell: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$, $(w_0, \dots, w_{n-1}) \mapsto n$ gilt

$$\ell(vw) = \ell(v) + \ell(w) \quad \text{und} \quad \ell(\epsilon) = 0$$

Beispiel

Wort 01101 über $\{0, 1\}$ hat Länge 5.

Lemma

Für die Längenfunktion $\ell: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$, $(w_0, \dots, w_{n-1}) \mapsto n$ gilt

$$\ell(vw) = \ell(v) + \ell(w) \quad \text{und} \quad \ell(\epsilon) = 0$$

Beispiel

Wort 01101 über $\{0, 1\}$ hat Länge 5.

Für $x = 01101$, $y = 110$ und $z = 10101$ sind

$$xy =$$

$$yx =$$

$$(xy)z =$$

$$x(yz) =$$

Lemma

Für die Längenfunktion $\ell: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$, $(w_0, \dots, w_{n-1}) \mapsto n$ gilt

$$\ell(vw) = \ell(v) + \ell(w) \quad \text{und} \quad \ell(\epsilon) = 0$$

Beispiel

Wort 01101 über $\{0, 1\}$ hat Länge 5.

Für $x = 01101$, $y = 110$ und $z = 10101$ sind

$$xy = 01101110$$

$$yx =$$

$$(xy)z =$$

$$x(yz) =$$

Lemma

Für die Längenfunktion $\ell: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$, $(w_0, \dots, w_{n-1}) \mapsto n$ gilt

$$\ell(vw) = \ell(v) + \ell(w) \quad \text{und} \quad \ell(\epsilon) = 0$$

Beispiel

Wort 01101 über $\{0, 1\}$ hat Länge 5.

Für $x = 01101$, $y = 110$ und $z = 10101$ sind

$$xy = 01101110$$

$$yx = 11001101$$

$$(xy)z =$$

$$x(yz) =$$

Lemma

Für die Längenfunktion $\ell: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$, $(w_0, \dots, w_{n-1}) \mapsto n$ gilt

$$\ell(vw) = \ell(v) + \ell(w) \quad \text{und} \quad \ell(\epsilon) = 0$$

Beispiel

Wort 01101 über $\{0, 1\}$ hat Länge 5.

Für $x = 01101$, $y = 110$ und $z = 10101$ sind

$$xy = 01101110$$

$$yx = 11001101$$

$$(xy)z = (01101110)10101 = 0110111010101$$

$$x(yz) =$$

Lemma

Für die Längenfunktion $\ell: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$, $(w_0, \dots, w_{n-1}) \mapsto n$ gilt

$$\ell(vw) = \ell(v) + \ell(w) \quad \text{und} \quad \ell(\epsilon) = 0$$

Beispiel

Wort 01101 über $\{0, 1\}$ hat Länge 5.

Für $x = 01101$, $y = 110$ und $z = 10101$ sind

$$xy = 01101110$$

$$yx = 11001101$$

$$(xy)z = (01101110)10101 = 0110111010101$$

$$x(yz) = 01101(11010101) = 0110111010101$$

Definition (lexikographische Ordnung)

\leq totale Ordnung auf Σ

Definition (lexikographische Ordnung)

\leq totale Ordnung auf Σ

Für Wörter $v, w \in \Sigma^*$ sei

$$v <_{\text{lex}} w$$

falls ein $k \in \mathbb{N}$ mit $k \leq \ell(v)$ und $k \leq \ell(w)$ existiert, sodass

Definition (lexikographische Ordnung)

\leq totale Ordnung auf Σ

Für Wörter $v, w \in \Sigma^*$ sei

$$v <_{\text{lex}} w$$

falls ein $k \in \mathbb{N}$ mit $k \leq \ell(v)$ und $k \leq \ell(w)$ existiert, sodass

(1) $v_i = w_i$ für $i = 0, \dots, k - 1$ und

Definition (lexikographische Ordnung)

\leq totale Ordnung auf Σ

Für Wörter $v, w \in \Sigma^*$ sei

$$v <_{\text{lex}} w$$

falls ein $k \in \mathbb{N}$ mit $k \leq \ell(v)$ und $k \leq \ell(w)$ existiert, sodass

(1) $v_i = w_i$ für $i = 0, \dots, k - 1$ und

(2) $(\ell(v) = k \text{ und } \ell(w) > k)$ oder $(\ell(v) > k \text{ und } \ell(w) > k \text{ und } v_k < w_k)$

Definition (lexikographische Ordnung)

\leq totale Ordnung auf Σ

Für Wörter $v, w \in \Sigma^*$ sei

$$v <_{\text{lex}} w$$

falls ein $k \in \mathbb{N}$ mit $k \leq \ell(v)$ und $k \leq \ell(w)$ existiert, sodass

(1) $v_i = w_i$ für $i = 0, \dots, k-1$ und

(2) ($\ell(v) = k$ und $\ell(w) > k$) oder ($\ell(v) > k$ und $\ell(w) > k$ und $v_k < w_k$)

Beispiel

Sei $\Sigma = \{a, b\}$ und $a < b$. Dann ist

$$\epsilon <_{\text{lex}} a \quad \epsilon <_{\text{lex}} b \quad a <_{\text{lex}} b \quad aa <_{\text{lex}} ab \quad aaaa <_{\text{lex}} ab$$

Definition (lexikographische Ordnung)

\leq totale Ordnung auf Σ

Für Wörter $v, w \in \Sigma^*$ sei

$$v <_{\text{lex}} w$$

falls ein $k \in \mathbb{N}$ mit $k \leq \ell(v)$ und $k \leq \ell(w)$ existiert, sodass

(1) $v_i = w_i$ für $i = 0, \dots, k-1$ und

(2) $(\ell(v) = k \text{ und } \ell(w) > k)$ oder $(\ell(v) > k \text{ und } \ell(w) > k \text{ und } v_k < w_k)$

Beispiel

Sei $\Sigma = \{a, b\}$ und $a < b$. Dann ist

$$\epsilon <_{\text{lex}} a \quad \epsilon <_{\text{lex}} b \quad a <_{\text{lex}} b \quad aa <_{\text{lex}} ab \quad aaaa <_{\text{lex}} ab$$

Satz

\leq_{lex} ist totale Ordnung auf Σ^*

Beweis (\leq_{lex} partielle Ordnung).

Um zu zeigen, dass \leq_{lex} eine partielle Ordnung ist, zeigen wir Irreflexivität und Transitivität von $<_{\text{lex}}$. Offensichtlich ist $<_{\text{lex}}$ irreflexiv.

Beweis (\leq_{lex} partielle Ordnung).

Um zu zeigen, dass \leq_{lex} eine partielle Ordnung ist, zeigen wir Irreflexivität und Transitivität von $<_{\text{lex}}$. Offensichtlich ist $<_{\text{lex}}$ irreflexiv. Um die Transitivität zu zeigen, seien $u, v, w \in \Sigma^*$ mit

$$u <_{\text{lex}} v \quad \text{und} \quad v <_{\text{lex}} w$$

Beweis (\leq_{lex} partielle Ordnung).

Um zu zeigen, dass \leq_{lex} eine partielle Ordnung ist, zeigen wir Irreflexivität und Transitivität von $<_{\text{lex}}$. Offensichtlich ist $<_{\text{lex}}$ irreflexiv. Um die Transitivität zu zeigen, seien $u, v, w \in \Sigma^*$ mit

$$u <_{\text{lex}} v \quad \text{und} \quad v <_{\text{lex}} w$$

Dann gibt es ein $k \in \mathbb{N}$ mit $k \leq \ell(u)$ und $k \leq \ell(v)$ und

- (1) $u_i = v_i$ für $i = 0, \dots, k-1$ und
- (2) $(\ell(u) = k \text{ und } \ell(v) > k)$ oder $(\ell(u) > k \text{ und } \ell(v) > k \text{ und } u_k < v_k)$

Beweis (\leq_{lex} partielle Ordnung).

Um zu zeigen, dass \leq_{lex} eine partielle Ordnung ist, zeigen wir Irreflexivität und Transitivität von $<_{\text{lex}}$. Offensichtlich ist $<_{\text{lex}}$ irreflexiv. Um die Transitivität zu zeigen, seien $u, v, w \in \Sigma^*$ mit

$$u <_{\text{lex}} v \quad \text{und} \quad v <_{\text{lex}} w$$

Dann gibt es ein $k \in \mathbb{N}$ mit $k \leq \ell(u)$ und $k \leq \ell(v)$ und

(1) $u_i = v_i$ für $i = 0, \dots, k-1$ und

(2) $(\ell(u) = k \text{ und } \ell(v) > k)$ oder $(\ell(u) > k \text{ und } \ell(v) > k \text{ und } u_k < v_k)$

sowie ein $l \in \mathbb{N}$ mit $l \leq \ell(v)$ und $l \leq \ell(w)$ und

(1) $v_i = w_i$ für $i = 0, \dots, l-1$ und

(2) $(\ell(v) = l \text{ und } \ell(w) > l)$ oder $(\ell(v) > l \text{ und } \ell(w) > l \text{ und } v_l < w_l)$

Beweis (\leq_{lex} partielle Ordnung).

Um zu zeigen, dass \leq_{lex} eine partielle Ordnung ist, zeigen wir Irreflexivität und Transitivität von $<_{\text{lex}}$. Offensichtlich ist $<_{\text{lex}}$ irreflexiv. Um die Transitivität zu zeigen, seien $u, v, w \in \Sigma^*$ mit

$$u <_{\text{lex}} v \quad \text{und} \quad v <_{\text{lex}} w$$

Dann gibt es ein $k \in \mathbb{N}$ mit $k \leq \ell(u)$ und $k \leq \ell(v)$ und

(1) $u_i = v_i$ für $i = 0, \dots, k-1$ und

(2) $(\ell(u) = k \text{ und } \ell(v) > k)$ oder $(\ell(u) > k \text{ und } \ell(v) > k \text{ und } u_k < v_k)$

sowie ein $l \in \mathbb{N}$ mit $l \leq \ell(v)$ und $l \leq \ell(w)$ und

(1) $v_i = w_i$ für $i = 0, \dots, l-1$ und

(2) $(\ell(v) = l \text{ und } \ell(w) > l)$ oder $(\ell(v) > l \text{ und } \ell(w) > l \text{ und } v_l < w_l)$

Dann gilt für $m := \min(k, l)$ auch $m \leq \ell(u)$ und $m \leq \ell(w)$ und

(a) $u_i = w_i$ für $i = 0, \dots, m-1$ und

(b) $(\ell(u) = m \text{ und } \ell(w) > m)$ oder $(\ell(u) > m \text{ und } \ell(w) > m \text{ und } u_m < w_m)$

sodass $u <_{\text{lex}} w$ folgt

Beweis (\leq_{lex} total)

Um zu zeigen, dass \leq_{lex} total ist, seien $v, w \in \Sigma^*$ mit $v \neq w$

Beweis (\leq_{lex} total)

Um zu zeigen, dass \leq_{lex} total ist, seien $v, w \in \Sigma^*$ mit $v \neq w$

Dann existiert ein $k \in \mathbb{N}$ mit $k \leq \ell(v)$ und $k \leq \ell(w)$, sodass

- (a) $v_i = w_i$ für $i = 0, \dots, k - 1$ und
- (b) ($\ell(v) = k$ und $\ell(w) > k$) oder ($\ell(v) > k$ und $\ell(w) = k$) oder
($\ell(v) > k$ und $\ell(w) > k$ und $v_k \neq w_k$)

Beweis (\leq_{lex} total)

Um zu zeigen, dass \leq_{lex} total ist, seien $v, w \in \Sigma^*$ mit $v \neq w$

Dann existiert ein $k \in \mathbb{N}$ mit $k \leq \ell(v)$ und $k \leq \ell(w)$, sodass

(a) $v_i = w_i$ für $i = 0, \dots, k - 1$ und

(b) $(\ell(v) = k \text{ und } \ell(w) > k)$ oder $(\ell(v) > k \text{ und } \ell(w) = k)$ oder
 $(\ell(v) > k \text{ und } \ell(w) > k \text{ und } v_k \neq w_k)$

Da \leq total auf Σ ist, gilt somit entweder $v <_{\text{lex}} w$ oder $w <_{\text{lex}} v$

Definition

\leq totale Ordnung auf Σ

Definition

\leq totale Ordnung auf Σ

Für Wörter $v, w \in \Sigma^*$ sei

$$v <_{\text{gradlex}} w$$

falls $l(v) < l(w)$ oder $(l(v) = l(w) \text{ und } v <_{\text{lex}} w)$

Definition

\leq totale Ordnung auf Σ

Für Wörter $v, w \in \Sigma^*$ sei

$$v <_{\text{gradlex}} w$$

falls $\ell(v) < \ell(w)$ oder $(\ell(v) = \ell(w) \text{ und } v <_{\text{lex}} w)$

Beispiel

Sei $\Sigma = \{a, b\}$ und $a < b$. Dann ist

$$\epsilon <_{\text{gradlex}} a \quad \epsilon <_{\text{gradlex}} b \quad a <_{\text{gradlex}} b \quad aa <_{\text{gradlex}} ab \quad aaaa >_{\text{gradlex}} ab$$

Definition

\leq totale Ordnung auf Σ

Für Wörter $v, w \in \Sigma^*$ sei

$$v <_{\text{gradlex}} w$$

falls $l(v) < l(w)$ oder $(l(v) = l(w) \text{ und } v <_{\text{lex}} w)$

Beispiel

Sei $\Sigma = \{a, b\}$ und $a < b$. Dann ist

$$\epsilon <_{\text{gradlex}} a \quad \epsilon <_{\text{gradlex}} b \quad a <_{\text{gradlex}} b \quad aa <_{\text{gradlex}} ab \quad aaaa >_{\text{gradlex}} ab$$

Satz

\leq_{gradlex} ist eine totale Ordnung auf Σ^*

Definition

\leq totale Ordnung auf Σ

Für Wörter $v, w \in \Sigma^*$ sei

$$v <_{\text{gradlex}} w$$

falls $l(v) < l(w)$ oder $(l(v) = l(w) \text{ und } v <_{\text{lex}} w)$

Beispiel

Sei $\Sigma = \{a, b\}$ und $a < b$. Dann ist

$$\epsilon <_{\text{gradlex}} a \quad \epsilon <_{\text{gradlex}} b \quad a <_{\text{gradlex}} b \quad aa <_{\text{gradlex}} ab \quad aaaa >_{\text{gradlex}} ab$$

Satz

\leq_{gradlex} ist eine totale Ordnung auf Σ^*

Beweis

Man prüft Irreflexivität, Transitivität und Totalität von $<_{\text{gradlex}}$ nach

Definition

$L \subseteq \Sigma^*$ heißt **formale Sprache** über Σ

Definition

$L \subseteq \Sigma^*$ heißt formale Sprache über Σ

Beispiel

Die formale Sprache der Palindrome über $\Sigma = \{a, b\}$ ist

$$\{w_0w_1 \dots w_{n-1} \mid w_0w_1 \dots w_{n-1} = w_{n-1}w_{n-2} \dots w_0\} = \\ \{\epsilon, a, b, aa, bb, aaa, aba, bab, bbb, aaaa, abba, baab, bbbb, \dots\}$$